

**ENDO
GASTROPB**

GASTROENTEROLOGIA
E ENDOSCOPIA DIGESTIVA

GUIA DE
PREPARO

PREPARO DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL

Hospital San Michele

Rua Brasília, 270 - Brasília
Centro, Pato Branco - PR, 85504-027

 **(46) 99100-9191**



PREPARO DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL

Você está recebendo as orientações gerais e de preparo para a realização da retossigmoidoscopia flexível na EndoGastroPB.

Pacientes com colostomia ou ileostomia precisam de preparo individualizado, mediante envio de relatório médico no momento do agendamento.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site ou entre em contato com nossa equipe.


Mais informações:

INFORMAÇÕES GERAIS

A retossigmoidoscopia é um exame endoscópico que permite avaliar o reto e parte do intestino grosso, podendo incluir procedimentos como biópsias e retirada de pólipos ou lesões.

 **Acompanhante obrigatório:** é necessário vir acompanhado por um adulto maior de 18 anos.

 **Após o exame:** não é permitido dirigir veículos ou utilizar motocicleta no mesmo dia.

 **Termo de consentimento:** junto a este documento, você receberá o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, contendo informações importantes sobre a realização do procedimento.

ATENÇÃO PARA AS PAUSAS NAS MEDICAÇÕES:

21 dias antes do exame: Suspenda Semaglutida ou Tirzepatida (Ozempic®, Wegovy®, Rybelsus® e Mounjaro®).

7 dias antes do exame: Suspenda, com autorização do seu médico assistente, os anticoagulantes e antiplaquetários, como Varfarina (Marevan® e Coumadin®), Clopidogrel (Plavix®, Plagrel® e Iscover®), Prasugrel (Effient®) e Ticlopidina (Ticlid®). Se possível, suspenda também Orlistate (Xenical®), Ginkgo biloba e antiácidos.

5 dias antes do exame: Ticagrelor (Brilinta®) e Sulfato ferroso.

2 dias antes do exame: Suspenda, com autorização do seu médico assistente, os anticoagulantes e antiplaquetários, como Apixabana (Eliquis®), Dabigatrana (Pradaxa®) e Rivaroxabana (Xarelto®).

2 dias antes do exame: Suspenda, com autorização do seu médico assistente, os anticoagulantes e antiplaquetários, como Apixabana (Eliquis®), Dabigatrana (Pradaxa®) e Rivaroxabana (Xarelto®). Suspenda também Cilostazol (Cebrelat® e Vasogard®) e Liraglutida (Victoza® e Saxenda®).



ATENÇÃO PARA AS PAUSAS NAS MEDICAÇÕES:

No dia do exame: Suspenda Enoxaparina (Clexane®) e as medicações para diabetes, como insulina e metformina.

Atenção: pacientes que utilizam insulina devem trazer a caneta de aplicação rápida no dia do exame.

Observações importantes:

O ácido acetilsalicílico (ASS® e Aspirina®), assim como as medicações para pressão arterial, para o coração e hormônios, não precisam ser suspensos. Eles podem ser tomados ao acordar com uma pequena quantidade de água.

Atenção: caso você seja diabético e utilize insulina, lembre-se de trazer sua caneta de aplicação rápida no dia do exame.

PREPARO INTESTINAL EM CASA – ALIMENTAÇÃO

Na véspera do exame:

Evite leite e derivados, refrigerantes e bebidas gaseificadas. Não consuma alimentos com resíduos, como cascas, folhas, bagaços e sementes.

Beba bastante líquido ao longo do dia: água, água de coco, bebidas isotônicas e sucos claros coados.

MEDICAÇÃO PARA COMPRA

Fleet Enema® ou Phosfoenema® 130 ml (1 unidade)

USO DA MEDICAÇÃO


2 horas antes de sair de casa para o exame:

- Aplicar todo o conteúdo de 1 bisnaga no reto, conforme orientações da bula.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

 Utilize roupas e calçados confortáveis.

 Água pura pode ser ingerida até 6 horas antes do exame.

 Caso o preparo não seja realizado corretamente, o exame poderá não ser realizado ou ser incompleto.

Bom preparo!

